

分類	入力コード	検査項目	検体 必要量 (mL)	容器	保存 方法	検査方法	基準値	実施料 判断料	所要 日数	備考
		項目コード								
内分泌学検査	05314	副甲状腺ホルモンintact (PTH-intact) 4C025000002205301	EDTA 血漿 0.3	14 ↓ 02	凍結	ECLIA	pg/mL 10—65	161 生化II	1～2	必ず血漿分離の上ご提出下さい。PTHは採血後、直ちに冷却下で血漿を分離することで不活性化を防ぎます。ヘパリン血漿は不可。
	10006	コルチゾール 4D040000002302101	血清 0.3	01	冷蔵	FEIA	μg/dL 6.4—21.0	121 生化II	1～2	
	10906	プロジェステロン 4F045000002302101	血清 0.3	01	冷蔵	FEIA	ng/mL P29 「プロジェステロン 基準値」参照	143 生化II	1～2	妊娠の有無、妊娠の週数を必ずご記入下さい。
	10905	エストラジオール (E ₂) 4F025000002302101	血清 0.3	01	冷蔵	FEIA	pg/mL P29 「エストラジオール (E ₂)基準値」参照	167 生化II	1～2	妊娠の有無、妊娠の週数を必ずご記入下さい。
	10642	ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG) 4F080000002302301	血清 0.5	01	冷蔵	FEIA	mIU/mL 0.5以下	130 生化II	1～2	
	05132	HCG (尿) 4F080000000102301	尿 1	25	冷蔵	FEIA	mIU/mL M 2.5未満 F (非妊婦) 2.5未満 4～11週 1,210—475,000 8～11週 21,900—709,000 12～20週 2,890—193,000 21～40週 1,680—74,300	130 生化II	1～2	
	10803	HCG+ β Z4F080000002305301	血清 0.3	01	冷蔵	ECLIA	mIU/mL M 2.0以下 F 非妊婦女性3.0以下 閉経後女性6.0以下	129 生化II	1～2	
	10091	インスリン (IRI) 4G010000002302301	血清 0.5	01	冷蔵	FEIA	μU/mL 1.1—17.0	100 生化II	1～2	
	10090	C-ペプチド (CPR) 4G020000002302301	血清 0.3	01	冷蔵	FEIA	ng/mL 0.69—2.45	105 生化II	1～2	
	03118	尿C-ペプチド 4G020000000102301	尿 0.3	16	凍結	FEIA		105 生化II	1～2	蓄尿での基準値は 18.3～124.4 μg/dayです。
	10798	ヒト心房性Na利尿ペプチド (hANP) 4Z270000002202301	血漿 0.3	08 ↓ 02	凍結	FEIA	pg/ml 43.0以下	221 生化II	1～2	必ず指定容器使用
	10659	脳性Na利尿ポリペプチド (BNP) 4Z271000002205201	EDTA 血漿 0.3	14 ↓ 02	凍結	CLEIA	pg/mL 18.4以下	130 生化II	1～2	
	10801	ヒト脳性ナトリウム利尿 ポリペプチド前駆体N端 フラグメント (NT-proBNP) 4Z272000002305301	血清 0.3	01	冷蔵	ECLIA	pg/mL 125.00未満	136 生化II	1～2	